


# FIVE SUPER SANITIZZANTE

**allegriini.**  
FOOD INDUSTRY

DISINFETTANTE ACIDO, FORTEMENTE OSSIDANTE, NON  
SCHIUMOGENO



- P.M.C. Reg. Min. Salute n°18715 a base di acido peracetico.
- Soddisfa i requisiti indicati dal Ministero della Salute per la prevenzione da COVID-19.
- Altamente efficace nel ridurre la carica batterica anche a freddo.



## CONSIGLI

Ideale per la disinfezione con sistema CIP in impianti ed attrezzature e con metodi tradizionali su superfici dure in generale.

## DESCRIZIONE

FIVE SUPER SANITIZZANTE è un disinfettante acido, fortemente ossidante, non schiumogeno, esente da cloro, facilmente biodegradabile e quindi accettabile dal punto di vista ambientale. Il prodotto è idoneo all'utilizzo nell'industria alimentare in generale e nel settore produttivo zootecnico. E' efficace su tutti i tipi di microrganismi anche a basse concentrazioni e basse temperature di esercizio. Alle diluizioni d'uso il prodotto non è corrosivo e può essere utilizzato sui seguenti materiali: acciaio inox, ferro zincato e banda stagnata, vetro, porcellana, polietilene, teflon, polistirolo, pvc, smalti e superfici in gomma. Ideale per la disinfezione di superfici dure in generale, di impianti cip, attrezzature e celle isoterme.

Principi attivi:  
Acido Peracetico 5%  
Acqua Ossigenata 26%  
Acido Acetico 5%

# FIVE SUPER SANITIZZANTE

**allegrini.**  
FOOD INDUSTRY

**DISINFETTANTE ACIDO, FORTEMENTE OSSIDANTE, NON  
SCHIUMOGENO**

## CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Aspetto             | Liquido limpido           |
| Colore              | Incolore                  |
| Odore               | Pungente                  |
| Peso specifico      | 1.120 ± 0.1 g/ml          |
| Solubilità in acqua | Completa in ogni rapporto |
| pH sol. 10%         | circa 2                   |
| Validità            | 12 mesi                   |



## POTERE SCHIUMOGENO

Nulla

## CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 25Kg - 016FIVE0025  
Tanica da 5Kg - 016FIVE0005

## MODALITÀ D'USO

### SUPERFICI DURE IN GENERALE:

Dopo aver pulito le superfici da disinfettare, preparare una soluzione a concentrazione compresa tra 0.2% e 0.6% con acqua di rete e distribuirla tramite nebulizzatore. Lasciar agire per almeno 15 minuti quindi risciacquare nel caso le superfici trattate dovessero venire a contatto con alimenti ed animali nel breve periodo.

### IMPIANTI CIP:

Dopo aver fatto circolare una soluzione detergente nell'impianto preparare una soluzione allo 0.3- 0.5% e farla circolare nell'impianto per 10 minuti.

## PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Nebulizzatore per  
prodotti acidi 6L  
01AA720035

Pistola easyclean  
01AA720115



Nebulizzatore  
elettrostatico  
01AVECTC100



# FIVE SUPER SANITIZZANTE

**allegriini.**  
FOOD INDUSTRY

**DISINFETTANTE ACIDO, FORTEMENTE OSSIDANTE, NON  
SCHIUMOGENO**

## TEST D'EFFICACIA

Le concentrazioni d'impiego sono in relazione alle temperature ed al tempo di contatto, di seguito riportiamo le conclusioni dei test di efficacia effettuati :

Attività battericida base secondo SR EN 1040 / 1997

Ceppi di riferimento : Staphylococcus Aureus e Pseudomonas Aeruginosa

Dosaggio 0.2%. Tempo di contatto 5 minuti. Temperatura 20°C.

Attività battericida secondo SR EN 1276 / 1997 in presenza di interferenti

Ceppi di riferimento : Staphylococcus Aureus , Pseudomonas Aeruginosa

Enterococcus Faecium, Escherichia Coli, Salmonella Typhimorium.

Dosaggio 0.3%. Tempo di contatto 5 minuti. Temperatura 20°C.

Attività battericida Test di Superficie in presenza di interferenti

secondo CEN/TC 216 WI 216028 1998

Ceppi di riferimento : Staphylococcus Aureus ,Pseudomonas Aeruginosa

Enterococcus Faecium, Escherichia Coli, Salmonella Typhimorium.

Dosaggio 0.3%. Tempo di contatto 5 minuti. Temperatura 20°C.

Attività fungicida secondo SR EN 1650 / 2008 in condizioni di sporco

Ceppi di riferimento : Candida Albicans e Aspergillus Niger

Dosaggio 0.6%. Tempo di contatto 15 minuti. Temperatura 20°C.

Attività sporicida secondo SR EN 13704 / 2002 in condizioni di pulito

Ceppi di riferimento: Bacillus Subtilis

Dosaggio 0.6%. Tempo di contatto 60 minuti. Temperatura 20°C.

Attività Micobattericida secondo SR EN 14348 / 2005 in condizioni di sporco

Ceppi di riferimento: Mycobacterium Terrae e Mycobacterium Avium

Dosaggio 0.6%. Tempo di contatto 15 minuti. Temperatura 20°C.

Attività virucida secondo SR EN 14476 / 2007 in condizioni di sporco

Ceppi di riferimento: Picornavirus (polio virus tipo 1) e Adenovirus (adenovirus tipo 5)

Dosaggio 0.6%. Tempo di contatto 15 minuti. Temperatura 20°C.

Rev. 06 Ed. 08/22